




GUIDE DES

INFECTIONS COURANTES

pour les fournisseurs de services de garde et les écoles

INTRODUCTION

Le présent guide vise à fournir aux écoles et aux centres de garde d'enfants des renseignements de base sur les maladies infantiles contagieuses courantes. Pour chaque maladie, on y décrit les signes et symptômes, la période de contagiosité, les modes de transmission et les moyens de prévenir la propagation. On y précise aussi s'il s'agit d'une maladie importante sur le plan de la santé publique (MISP) qui doit être déclarée au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex

Les parents et tuteurs qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les maladies décrites dans le présent guide peuvent consulter le site wechu.org/health-topics.

INDEX

MALADIES IMPORTANTES SUR LE PLAN DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Amibiase.....	7
Campylobactériose.....	7
Coqueluche.....	9
COVID-19 (maladie à coronavirus).....	9
Giardiase.....	12
Grippe.....	13
Hépatite A.....	13
Hépatite B.....	14
Méningite.....	15
Oreillons.....	18
Rougeole.....	20
Rubéole.....	21
Salmonellose.....	21
Shigellose.....	22
Varicelle (picote).....	23
Yersiniose.....	24

AUTRES MALADIES COURANTES

Cinquième maladie.....	8
Conjonctivite.....	8
Dermatophytose (teigne).....	10
Diarrhée et vomissements (gastroentérite).....	11
Feu sauvage (herpès simplex virus de type 1).....	11
Gale.....	12
Impétigo.....	14
Maladie mains-pieds-bouche.....	15
Molluscum contagiosum.....	16
Mononucléose.....	16
Morsure (enfant à enfant).....	4
Muguet.....	17
Norovirus.....	17
Oxyurose.....	18
Piqûre de tique.....	5
Poux de tête.....	6
Punaises de lit.....	6
Rhume (maladie respiratoire).....	19
Roséole (sixième maladie).....	19
Rotavirus.....	20
Scarlatine/angine streptococcique.....	22
Virus respiratoire syncytial (VRS).....	23
Zona (herpès zoster).....	24

NOUS JOINDRE

N'hésitez pas à appeler les lignes d'information du Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex pendant les heures d'ouverture si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations. Pour obtenir la liste complète des numéros de téléphone, consultez le site wechu.org et sélectionnez « Contact Us ».

SIGNALEMENT

SIGNALER UNE MALADIE IMPORTANTE SUR LE PLAN DE LA SANTÉ PUBLIQUE

La direction est tenue de signaler les [maladies importantes sur le plan de la santé publique \(MISP\)](#) au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex **dans un délai d'un jour ouvrable** à compter de la réception de l'avis d'une maladie transmissible, par exemple, lorsque des parents/tuteurs signalent une MISP après avoir consulté un fournisseur de soins de santé.

Comment signaler une MISP

- Remplir le formulaire de signalement de MISP à l'adresse suivante : www.wechu.org/dophs-reporting.
- Ce formulaire doit être soumis **dans un délai d'un jour ouvrable** à compter de la réception de l'avis d'une maladie transmissible.
- Une fois votre formulaire soumis, le Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex communiquera avec vous **dans un délai d'un jour ouvrable** pour vous donner d'autres consignes.



SIGNALEMENT DE TAUX ÉLEVÉS D'ABSENTÉISME

La direction doit signaler un taux élevé d'absentéisme dans les cas suivants :

- l'école ou le centre enregistre **un taux d'absentéisme pour cause de maladie d'au moins 20 %** parmi les élèves et le personnel, ou
- il existe des préoccupations concernant un taux d'absentéisme élevé au sein d'une classe ou d'un groupe précis (il peut s'agir de taux inférieurs à 20 %).

Comment signaler une absence

- Remplir le formulaire initial de signalement de l'absentéisme à l'adresse suivante : www.wechu.org/absenteeism-reporting.
- Une fois votre formulaire soumis, le Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex communiquera avec la direction **dans un délai d'un jour ouvrable** pour donner d'autres consignes.



Si vous avez des questions lors de l'envoi de ces formulaires, communiquez avec le service de prévention des maladies infectieuses au 519 258-2146, poste 1420.



QU'EST-CE QU'UNE MALADIE TRANSMISSIBLE?

Toute maladie qui peut être transmise d'une personne à une autre est considérée comme transmissible ou contagieuse. Une personne ne peut transmettre une maladie qu'à certains moments, ce que l'on appelle la « période de contagiosité ». Pendant cette période, il peut être recommandé aux personnes concernées de ne pas se présenter à l'école ou au centre de garde afin de prévenir la propagation de la maladie. La direction doit examiner et mettre à jour chaque année la politique de l'établissement relative aux maladies.

Comment les infections se propagent-elles?

Les infections sont causées par des microbes, comme des bactéries, des virus, des parasites et des champignons. Ces microbes peuvent se trouver dans les liquides corporels et les sécrétions, comme les selles (excréments), la salive, les mucosités et les expectorations.

Les microbes à l'origine des maladies transmissibles se transmettent d'une personne à une autre des façons suivantes :

- Contact direct avec une personne infectée chez qui le microbe est présent dans le nez, la bouche, les yeux, les selles ou sur la peau.
- Contact direct lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue ou tousse et qui se trouve à proximité.
- Contact indirect lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par des microbes, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.
- Contact indirect lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés.

Comment les infestations se propagent-elles?

Il y a infestation lorsque des parasites, comme les tiques, les poux ou les puces, vivent à la surface du corps d'une personne, y compris la peau ou les cheveux.

- Contact direct avec une personne atteinte d'une infestation, notamment par un contact étroit peau contre peau ou cheveux contre cheveux.
- Contact indirect lorsqu'une personne touche la zone contaminée, puis touche les mains ou la peau d'une autre personne.
- Contact indirect lors du partage d'objets personnels, comme des peignes, des brosses à cheveux, des chapeaux, des casques, des serviettes, des vêtements ou de la literie.

COMMENT PRÉVENIR LA PROPAGATION

Hygiène des mains et prévention des maladies

- L'hygiène des mains est l'un des moyens les plus simples et les plus importants de prévenir la propagation des infections.
- Favoriser les bonnes habitudes d'hygiène des mains et s'assurer de donner accès à de l'eau tiède courante, à du savon et à des serviettes en papier ou à du désinfectant pour les mains à base d'alcool (contenant de 70 à 90 % d'alcool).
- Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes.
- Donner aux enfants le temps qu'il faut pour [se laver les mains](#) après une visite aux toilettes et avant de manger.
- Enseigner et renforcer [l'étiquette respiratoire](#) (tousser ou éternuer dans le [creux du coude ou un mouchoir](#), puis se laver les mains).
- Dissuader le partage d'objets personnels, comme les tasses, les ustensiles, le baume pour les lèvres, les brosses à dents et les brosses à cheveux.

Rester à la maison lorsqu'une personne est malade

- Encourager les parents/tuteurs à ne pas envoyer leurs enfants à l'école ou au centre de garde d'enfants en cas d'infection.

Vaccination

- Rappeler aux parents/tuteurs de vérifier le [dossier d'immunisation](#) de leurs enfants.
- S'ils ne savent pas avec certitude si leurs enfants ont reçu tous leurs vaccins, leur rappeler de se renseigner auprès de leur fournisseur de soins de santé ou du Bureau de santé.

Nettoyage

- Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées et les objets partagés, comme les jouets et les poignées de porte, et augmenter la fréquence de nettoyage en cas de maladie.
- Respecter les procédures appropriées pour la manipulation et l'élimination des objets contaminés, comme porter des gants et se laver les mains par la suite.

Salubrité des aliments

- Renforcer et mettre en pratique les procédures de [manipulation sécuritaire des aliments](#), comme laver tous les fruits et légumes crus sous l'eau courante propre, ainsi que conserver et bien faire cuire les aliments.

MORSURE (enfant à enfant)

Que faire si un enfant se fait mordre par un autre enfant?

Il arrive souvent que les jeunes enfants mordent. La majorité des morsures sont bénignes et ne transpercent pas la peau. Si la peau est transpercée ou si l'enfant qui mord a du sang dans la bouche, des microbes peuvent être transmis. On recommande alors que les enfants soient vus par un fournisseur de soins de santé.

Soins des plaies causées par une morsure

Il faut toujours porter des gants lorsqu'on manipule du sang et des liquides corporels.

Si la **peau n'est pas transpercée**, nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon, puis appliquer une compresse froide.

Si la **peau est transpercée** :

1. Laisser saigner la plaie.
2. Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon.
3. Signaler l'incident (morsure) aux parents/tuteurs.
4. Recommander un suivi médical.



TIQUES

Que faire si un enfant se fait piquer par une tique?

Certaines maladies peuvent être transmises par une piqûre de tique, comme la maladie de Lyme, la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, la maladie de Powassan, l'anaplasmose, la babésiose et la tularémie. La taille et la couleur des tiques varient. La tique à pattes noires, qui peut transmettre la maladie de Lyme, est petite (elle mesure entre 3 et 5 mm) et de couleur foncée. En cas de piqûre, retirer la tique le plus rapidement possible, car le risque d'infection augmente lorsqu'une tique reste accrochée à la peau pendant 24 heures ou plus. Suivre les étapes suivantes :

1. À l'aide de pinces à épiler, saisir la tique le plus près possible de la peau.
2. Tirer doucement la tique sans la tourner.
3. Il est important de ne pas l'écraser, la suffoquer ou la brûler.
4. Laver doucement le site de la piqûre avec de l'eau et du savon, puis appliquer un désinfectant (p. ex. de l'alcool) sur la peau.
5. **Placer la tique** dans un contenant ou un petit sac en plastique qui peut être scellé. Y ajouter un morceau d'essuie-tout humide. Demander au parent d'envoyer une photo de la tique à www.etick.ca. Il s'agit d'un service en ligne gratuit qui permet l'identification des tiques à partir de photos. **Prendre note que le Bureau de santé n'accepte plus les tiques aux fins d'analyse ou d'identification.**
6. Recommander aux parents/tuteurs d'assurer un suivi auprès de leur fournisseur de soins de santé.
7. Inviter les parents/tuteurs à consulter le site www.wechu.org pour obtenir de plus amples renseignements.

Source : Agence de la santé publique du Canada.



Prévenir les piqûres de tiques

Demander aux parents/tuteurs de suivre les recommandations suivantes :

- Utiliser un insectifuge :
 - Les produits contenant du **DEET** peuvent être utilisés en toute sécurité conformément aux concentrations recommandées, selon l'âge de l'utilisateur. (Gouvernement du Canada, 2016)
 - Enfants de 6 mois à 2 ans : concentration maximale de 10 %; une seule application par jour.
 - Enfants de 2 à 12 ans : concentration maximale de 10 %; maximum de 3 applications par jour.
 - Enfants de plus de 12 ans et adultes : concentration maximale de 30 %.
- **REMARQUE :**
 - Enfants de moins de 6 mois : aucun insectifuge contenant du DEET.
 - Enfants de moins de 12 ans : ne pas utiliser d'insectifuges contenant du DEET quotidiennement pendant plus de 1 mois.
- Les produits contenant de **l'icaridine** ne doivent pas être utilisés chez les enfants de moins de six mois.
- Éviter de marcher dans l'herbe haute et rester au milieu des sentiers.
- Se couvrir. Porter des hauts à manches longues et des pantalons, et rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes.
- Vérifier minutieusement le corps de vos enfants et de vos animaux de compagnie après une sortie à l'extérieur.
- Prendre une douche dans les deux heures qui suivent une sortie à l'extérieur.
- Mettre les vêtements dans la sècheuse à haute température (pendant au moins 60 minutes) pour tuer les tiques.
- Mettre un collier anti-tiques à vos animaux de compagnie ou leur donner des médicaments anti-tiques par voie orale prescrits par votre vétérinaire.
- Garder la pelouse courte dans votre cour.

POUX DE TÊTE

Que faire si un enfant a des poux de tête?



Les éclosions de poux de tête sont courantes chez les enfants dans les écoles et autres établissements. Les poux de tête se transmettent par contact direct tête contre tête avec une personne infestée et par contact avec les objets qu'elle utilise, comme les chapeaux et les brosses à cheveux. Les poux de tête peuvent être transmis d'une personne à une autre s'il y a des poux ou des œufs viables (lentes) sur la personne infestée ou sur les objets qu'elle touche. Les œufs de poux peuvent survivre jusqu'à trois jours loin de leur hôte humain. Les poux de tête nouvellement éclos ne peuvent survivre qu'un ou deux jours loin de l'hôte.

En cas d'infestation par des [poux de tête](#), demander aux parents/tuteurs de suivre les recommandations suivantes :

1. Les vêtements, la literie et les autres objets utilisés par l'enfant qui a des poux doivent être lavés à l'eau chaude et séchés dans une sècheuse à température élevée, être nettoyés à sec ou traités à l'aide d'un insecticide chimique efficace.
2. Les membres de la famille et les autres personnes qui ont été en contact étroit avec l'enfant doivent être examinés et, s'il y a lieu, traités.

Comment traite-t-on une infestation de poux de tête?

On peut traiter les [poux de tête](#) à l'aide d'un shampoing médicamenteux approprié et en éliminant les poux et leurs œufs. La méthode du passage du peigne dans les cheveux mouillés sans produits chimiques est également possible, mais elle est nettement moins efficace. Les enfants qui ont des poux de tête ne sont pas tenus de rester chez eux. La direction devrait consulter la politique de l'établissement pour obtenir d'autres consignes. Pour de plus amples renseignements sur les traitements, consulter le site soinsdenosenfants.cps.ca.

Prévenir les poux de tête

Demander aux parents/tuteurs de suivre les recommandations suivantes :

- Inspecter régulièrement la tête de vos enfants pour détecter la présence de poux.
- Dissuader les enfants de partager leurs vêtements, leurs chapeaux, leurs accessoires pour les cheveux, leurs serviettes et leurs peignes.

PUNAISES DE LIT

Que faire si un enfant a été piqué par des punaises de lit?



Les punaises de lit sont de petits insectes sans ailes qui se nourrissent du sang des humains et des animaux. Elles ne sautent pas et ne volent pas; elles sont plutôt transportées d'un endroit à un autre par les humains. Les punaises de lit se cachent dans de petits espaces, notamment les coutures des vêtements, les sacs et les meubles. Il est très difficile de s'en débarrasser.

Si un enfant a des piqûres de punaises de lit, demander aux parents/tuteurs de suivre les recommandations suivantes :

1. Laver les vêtements, les draps, les taies d'oreiller et les rideaux à l'eau chaude et les placer dans une sècheuse à température élevée pendant 30 minutes.
2. Nettoyer à la vapeur les gros articles qui ne peuvent pas être lavés (p. ex. les matelas).
3. Jeter ce qui ne peut pas être lavé, chauffé ou nettoyé à la vapeur.
4. Passer un aspirateur muni d'une brosse rigide partout où il y a des punaises de lit (ne pas utiliser d'aspirateur à main ni d'aspirateur doté d'un sac de tissu ou d'un tuyau en tissu).
5. Placer le sac d'aspirateur dans un sac en plastique blanc, sceller le sac et le jeter dans une poubelle à l'extérieur de la maison; laver l'aspirateur et tous les accessoires avec de l'eau chaude et du détergent.

Comment traite-t-on les piqûres de punaises de lit?

La majorité des piqûres de punaises de lit disparaissent sans traitement. Conseiller aux parents/tuteurs de consulter un fournisseur de soins de santé si les piqûres provoquent de fortes démangeaisons, car elles peuvent s'infecter. Les enfants ayant des piqûres de punaises de lit **peuvent** tout de même aller à l'école ou au centre de garde d'enfants.

Prévenir les infestations

La direction est invitée à consulter la politique de l'établissement afin de savoir avec qui communiquer pour faire appel à des services professionnels d'extermination, au besoin.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les punaises de lit, consulter notre [page Web](#) and Canada.ca.

*** Le présent guide est fourni à titre d'information seulement.** Il ne remplace en aucun cas les conseils donnés, les diagnostics posés ou les traitements prescrits par un fournisseur de soins de santé. Inviter les personnes concernées à consulter leur fournisseur de soins de santé pour toute préoccupation relative à leur santé. Les personnes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli doivent consulter leur fournisseur de soins de santé au besoin afin de discuter des mesures de prévention et de contrôle des maladies transmissibles.

Note : Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement. Le diagnostic des infections suivantes doit être posé par un fournisseur de soins de santé.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Amibiase <i>Parasite</i>	Généralement observés de 2 à 4 semaines après l'exposition : • Diarrhée grave • Douleurs ou crampes à l'estomac • Sang dans les selles • Fièvre • Frissons • Perte de poids	Une personne peut transmettre la maladie tant que le microbe est présent dans les selles, ce qui peut durer des années.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.
Campylobactériose <i>Bactérie</i>	Généralement observés de 2 à 5 jours après l'exposition : • Diarrhée (il peut y avoir présence de sang) • Malaise • Fièvre • Nausées et vomissements • Douleurs ou crampes à l'estomac	Une personne est contagieuse tant que le microbe est présent dans les selles, généralement de plusieurs jours à plusieurs semaines.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés. • Contact avec des animaux infectés.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Cinquième maladie (parvovirus) <i>Virus</i>	Généralement observés de 4 à 21 jours après l'exposition : • Fièvre légère et symptômes de rhume (malaise, douleurs musculaires et maux de tête) de 7 à 10 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée • Éruption cutanée très rouge sur les joues (comme si la personne avait été giflée) se propageant au torse, aux bras, aux mains, aux jambes et aux pieds • L'éruption peut réapparaître de 1 à 3 semaines plus tard si la personne est exposée au soleil ou à la chaleur	Une personne est contagieuse quelques jours avant l'apparition de l'éruption cutanée et jusqu'à ce que celle-ci apparaisse. La personne n'est plus contagieuse une fois que l'éruption cutanée apparaît.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Conjonctivite <i>Virus/bactérie</i>	Généralement observés de 1 à 3 jours après l'exposition : • Yeux rouges ou roses • Enflure des yeux • Démangeaison, irritation et douleur des yeux • Larmolement abondant • Écoulement ou pus au niveau des yeux (habituellement s'il s'agit d'une infection bactérienne) qui peut rendre les paupières collantes pendant le sommeil et s'accumuler dans le coin des yeux pendant les périodes d'éveil	Une personne doit être considérée comme contagieuse jusqu'à la disparition des symptômes.	Contact direct et indirect • Transmission d'une personne à une autre par contact direct avec les sécrétions de l'œil d'une personne infectée. • Se toucher les yeux avec les mains ou des objets contaminés (p. ex. brosse de mascara).	L'enfant doit se faire évaluer par un fournisseur de soins de santé et attendre 24 heures après le début du traitement antibiotique ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écoulement oculaire avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Coqueluche <i>Bactérie</i>	Généralement observés 9 ou 10 jours après l'exposition, mais peuvent également être observés de 6 à 20 jours après : • Commence habituellement par des symptômes semblables à ceux du rhume, y compris une toux légère • Après 1 ou 2 semaines, la toux s'aggrave par de nombreuses quintes de toux explosives qui peuvent nuire à la respiration, à l'alimentation et au sommeil. C'est à ce moment-là que l'on peut entendre un bruit aigu à l'inspiration, souvent suivi de vomissements.	Une personne est contagieuse dès l'apparition des symptômes et jusqu'à 21 jours après le début de la toux. Une personne n'est plus contagieuse après 5 jours de traitement antibiotique efficace.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.
COVID-19 (maladie à coronavirus) <i>Virus</i>	Généralement observés de 1 à 14 jours après l'exposition : • Fièvre et frissons • Essoufflement • Diminution ou perte de l'odorat ou du goût • Malaise, fatigue extrême • Douleurs musculaires et articulaires • Nausées, vomissements et diarrhée • Mal de gorge, écoulement nasal • Maux de tête	Une personne est habituellement contagieuse 48 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins 10 jours après. Les personnes immunodéprimées peuvent être contagieuses jusqu'à 20 jours après l'apparition des symptômes.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la diarrhée ou les vomissements aient cessé depuis 48 heures, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Dermatophytose (teigne) <i>Champignon</i>	Généralement observés de 10 à 14 jours après l'exposition dans le cas des infections du cuir chevelu et de 4 à 10 jours dans le cas des infections de la peau et de l'aîne : • Peau : lésion plate et circulaire au bord surélevé qui s'étend (le pourtour est habituellement rouge et peut-être sec et squameux ou suintant et croûté). S'appelle eczéma marginé (jock itch) si l'infection apparaît dans l'aîne. • Pieds (surtout entre les orteils) : peau rouge, enflée et squameuse qui démange; peut aussi toucher la plante du pied et le talon (s'appelle aussi pied d'athlète). • Cuir chevelu : petite plaque squameuse qui se propage laissant des zones squameuses temporairement dépourvues de cheveux.	Une personne peut être contagieuse tant que l'éruption cutanée n'est pas traitée ou n'est pas recouverte.	Contact direct et indirect • Contact direct peau contre peau avec une personne ou un animal infecté. • Contact avec des mains, des surfaces ou des objets contaminés (p. ex. peignes et vêtements, serviettes et literie non lavés).	L'enfant doit voir un fournisseur de soins de santé et commencer le traitement avant de reprendre ses activités habituelles et de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants. L'enfant doit éviter les piscines et ne doit pas participer aux cours d'éducation physique ou à des activités sportives exigeant des contacts rapprochés (p. ex. la lutte) avant le début du traitement.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Diarrhée et vomissements (gastroentérite)	Les principaux symptômes de la gastroentérite sont les suivants : • Nausées • Vomissements • Diarrhée • Douleurs abdominales • Ces symptômes s'accompagnent généralement d'une perte d'appétit, de faiblesse, de douleurs corporelles et de fièvre.	La gastroentérite peut être causée par des virus, des bactéries ou des parasites, mais elle peut également être causée par certains médicaments ou des toxines chimiques. La cause la plus fréquente de gastroentérite chez les enfants est le norovirus. Une personne peut être contagieuse avant l'apparition des symptômes, pendant la durée de ceux-ci et après leur disparition, selon la cause.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés.	L'enfant doit attendre que la diarrhée et les vomissements aient cessé depuis 48 heures, avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants ou suivre les consignes d'un fournisseur de soins de santé.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme.
Feu sauvage (herpès simplex virus de type 1) <i>Virus</i>	Généralement observés de 2 jours à 2 semaines après l'exposition : • Picotements ou démangeaisons à l'endroit du feu sauvage • Fièvre • Irritabilité • Lésions douloureuses dans la bouche ou autour de celle-ci	Le virus demeure dans l'organisme et des récurrences sont possibles. Une personne est très contagieuse lorsque les symptômes sont présents. Il est possible de transmettre le virus pendant de nombreuses années, même en l'absence de symptômes.	Contact direct et indirect • Transmission d'une personne à une autre par contact avec la salive d'une personne infectée ou des objets contaminés par la salive (p. ex. baisers ou partage d'ustensiles).	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants. Il faut éviter tout contact direct avec les lésions, les feux sauvages ou la salive.	Non

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Gale <i>Parasite</i>	Généralement observés de 2 à 6 semaines après l'exposition. Si la personne avait déjà été infectée, les symptômes pourraient apparaître de 1 à 4 jours après la réexposition : • Éruption cutanée sous forme de petits boutons rouges causant des démangeaisons intenses (surtout la nuit); apparaît habituellement entre les doigts, au niveau des coudes, des poignets et des aisselles et sur l'abdomen et les cuisses • Causée par des acariens sous la peau	Une personne est contagieuse jusqu'à ce que les acariens et les œufs soient tués par le traitement.	Contact direct et indirect • Contact direct et prolongé peau contre peau avec une personne infectée. • Contact avec des mains, des surfaces ou des objets contaminés (p. ex. peignes et vêtements, serviettes et literie non lavés).	L'enfant doit voir un fournisseur de soins de santé et commencer le traitement avant de reprendre ses activités et retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Giardiase <i>Parasite</i>	Généralement observés de 3 à 25 jours après l'exposition : • Diarrhée • Gaz et ballonnements • Selles nauséabondes • Selles molles, fréquentes, grasses et de couleur pâle • Fatigue • Perte d'appétit • Perte de poids • Parfois asymptomatique	Une personne est contagieuse tant que le microbe est présent dans les selles, ce qui peut durer des semaines, voire des mois.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés. • Contact avec des animaux infectés.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Grippe <i>Virus</i>	Généralement observés de 1 à 4 jours après l'exposition : • Apparition soudaine de fièvre et de frissons • Toux • Écoulement nasal ou congestion nasale • Mal de gorge • Douleurs et maux généralisés • Maux de tête • Malaise et fatigue • Les enfants peuvent également avoir des nausées, des vomissements et de la diarrhée	Une personne est habituellement contagieuse 24 heures avant le début des symptômes et jusqu'à 7 jours après.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Hépatite A <i>Virus</i>	Généralement observés de 15 à 50 jours après l'exposition : • Les enfants plus jeunes n'ont habituellement pas de symptômes ou s'ils en ont, ils sont légers et de courte durée • Malaise • Fièvre • Perte d'appétit • Nausées • Douleurs abdominales • Jaunissement du blanc des yeux et de la peau (jaunisse) et urine foncée	Une personne est très contagieuse 2 semaines avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 7 jours après l'apparition de la jaunisse. Toutefois, certains nourrissons et enfants peuvent être contagieux plus longtemps. Le virus peut demeurer contagieux dans l'environnement pendant plusieurs semaines.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Hépatite B <i>Virus</i>	Généralement observés de 45 à 180 jours après l'exposition : • Les enfants plus jeunes n'ont habituellement pas de symptômes ou s'ils en ont, ils sont légers et de courte durée • Perte d'appétit • Fatigue • Nausées et vomissements • Douleurs abdominales • Jaunissement du blanc des yeux et de la peau (jaunisse) et urine foncée • Éruption cutanée • Douleurs articulaires	Une personne est contagieuse de plusieurs semaines avant l'apparition des symptômes jusqu'à plusieurs mois, voire plusieurs années, après s'être rétablie de la maladie. La personne peut être contagieuse toute de sa vie.	Contact direct • Transmission d'une personne à une autre par contact avec du sang ou des liquides corporels contaminés qui pénètrent dans l'organisme par une coupure, une plaie ou une muqueuse (p. ex. partage de rasoirs, de coupe-ongles ou de brosses à dents). • Ne se transmet pas par l'eau, les aliments ou les contacts ordinaires.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.
Impétigo <i>Bactérie</i>	Généralement observés de 7 à 10 jours après l'exposition : • Grappes de boutons rouges ou de cloques habituellement autour de la bouche et du nez ou sur les parties exposées du corps (bras et jambes) • Les cloques peuvent se mettre à suinter, puis se recouvrir d'une croûte jaunâtre • Démangeaisons possibles	Une personne est contagieuse dès l'apparition des symptômes jusqu'à 24 heures après le début du traitement antibiotique.	Contact direct et indirect • Contact direct peau contre peau avec les lésions ou les sécrétions de la zone infectée. • Contact indirect lorsqu'une personne touche des mains, des surfaces ou des objets contaminés, les microbes pouvant alors pénétrer dans l'organisme par une lésion cutanée.	L'enfant doit attendre 24 heures après le début du traitement antibiotique avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants. Recouvrir les lésions exposées d'un pansement imperméable dans la mesure du possible.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Maladie mains-pieds-bouche <i>Virus</i>	Généralement observés de 3 à 6 jours après l'exposition : • Fièvre légère • Mal de gorge • Ulcères douloureux dans la bouche (parfois) • Éruption cutanée : taches rouges, souvent surmontées de petites ampoules, sur la paume des mains, la plante des pieds et, parfois, d'autres parties du corps	Une personne est très contagieuse pendant la première semaine de la maladie. Le virus peut demeurer présent dans les selles pendant plusieurs semaines ou mois après le début de l'infection. Le virus n'est pas présent aussi longtemps dans les sécrétions respiratoires (de 1 à 3 semaines ou moins).	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Méningite (bactérienne, virale ou autre)	Varient selon le microbe en cause, mais apparaissent très soudainement : • Maux de tête intenses, raideur du cou • Forte fièvre • Vomissements • Somnolence, confusion, manque d'énergie • Convulsions • Éruption cutanée, surtout sur les mains et les pieds • Irritabilité, refus de manger, pleurs constants, sommeil perturbé (nouveau-nés et nourrissons) • Fontanelle bombée et température corporelle anormalement basse (nourrissons)	Dépend du type de microbe (méningite bactérienne, virale ou autre).	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Molluscum contagiosum <i>Virus</i>	Généralement observés de 2 à 4 semaines après l'exposition, mais parfois jusqu'à 6 mois après : • Petites lésions (bosses) translucides ou de couleur chair de 2 à 5 mm de diamètre, surtout sur le torse, le visage, les bras et les jambes • La majorité des enfants auront entre 1 et 20 bosses.	Inconnue, mais persiste probablement tant que les lésions sont présentes.	Contact direct et indirect • Contact direct peau contre peau avec les lésions. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants. Recouvrir les lésions non couvertes par des vêtements avec un pansement imperméable si l'enfant participe à des sports ou à des activités de contact ou pratique la natation.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Mononucléose <i>Virus</i>	Généralement observés de 30 à 50 jours après l'exposition : • Jeunes enfants : symptômes peu graves ou absence de symptômes • Fièvre • Mal de gorge • Ganglions enflés • Fatigue • Enflure possible du foie ou de la rate	Une personne peut être contagieuse jusqu'à un an ou plus après l'infection.	Contact direct et indirect • Contact avec la salive d'une personne infectée ou des objets contaminés par la salive (p. ex. baisers ou partage d'objets contaminés, comme des jouets, des brosses à dents, des tasses ou des biberons).	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Muguet (candidose) <i>Levure</i>	Taches blanchâtres ou grisâtres à l'intérieur des joues, sur le palais ou sur la langue	Une personne est contagieuse tant qu'elle présente des symptômes.	Bien que la transmission de personne à personne soit rare, la maladie peut se transmettre par contact avec les sécrétions de la bouche, de la peau ou d'autres sécrétions corporelles contenant le microbe.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants ou suivre les consignes d'un fournisseur de soins de santé.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Norovirus <i>Virus</i>	Généralement observés de 12 à 48 heures après l'exposition : • Apparition soudaine de nausées et de vomissements • Diarrhée liquide • Crampes abdominales • Maux de tête • Fièvre légère • Malaise • Douleurs musculaires	Une personne peut être contagieuse avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 3 semaines après leur disparition. Une personne est très contagieuse lorsqu'elle présente des symptômes.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés. • Lorsqu'une personne respire des gouttelettes de vomissures.	L'enfant doit attendre que la diarrhée et les vomissements aient cessé depuis 48 heures avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants ou suivre les consignes d'un fournisseur de soins de santé.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Oreillons <i>Virus</i>	Généralement observés de 16 à 18 jours après l'exposition, mais peuvent également être observés de 12 à 25 jours après : • Certaines personnes n'ont pas de symptômes • Fièvre • Enflure et douleur des glandes salivaires (situées devant et sous les oreilles) • Douleurs musculaires • Malaise • Perte d'appétit • Maux de tête • Enflure des testicules	Une personne peut être contagieuse 7 jours avant le début de l'enflure des glandes salivaires et jusqu'à 5 jours après. Certaines personnes ne présentent pas les symptômes typiques, mais peuvent quand même transmettre le virus.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Contact avec la salive, notamment par les baisers et le partage d'aliments et de boissons.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.
Oxyurose <i>Parasite</i>	Généralement observés de 1 à 2 mois ou plus après l'exposition : • De nombreuses infections sont asymptomatiques. • Démangeaisons de l'anus (rectum), surtout la nuit	Une personne peut être contagieuse tant que le parasite pond des œufs dans la région anale.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Les œufs survivent sur les surfaces pendant 2 à 3 semaines (p. ex. la literie, les serviettes, les jouets, les vêtements, les sièges de toilette ou les baignoires).	L'enfant doit se faire évaluer par un fournisseur de soins de santé, et attendre que le traitement soit commencé et que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Rhume (maladie respiratoire) <i>Virus</i>	Généralement observés de 12 heures à 5 jours après l'exposition : •Écoulement nasal ou congestion nasale •Éternuements •Mal de gorge •Toux •Perte d'appétit •Fièvre (parfois)	Une personne est habituellement contagieuse 24 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 5 jours après.	Contact direct et indirect •Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. •Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Roséole (sixième maladie) <i>Virus</i>	Généralement observés 9 ou 10 jours après l'exposition : •Apparition soudaine d'une forte fièvre (plus de 39,5 °C) qui dure de 3 à 7 jours. Certains enfants qui ont une forte fièvre peuvent avoir des convulsions. •Éruption cutanée rouge et saillante (dure de quelques heures à plusieurs jours) qui apparaît quand la fièvre baisse (habituellement le 4e jour)	Un enfant est très contagieux lorsque la fièvre est élevée et peut être contagieux même en l'absence de symptômes.	Contact direct et indirect •Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. •Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Rotavirus <i>Virus</i>	Généralement observés de 1 à 3 jours après l'exposition : • Vomissements • Fièvre • Diarrhée liquide	Une personne peut être contagieuse 2 jours avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 10 jours après. Une personne infectée peut transmettre le virus, même si elle est asymptomatique.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés.	L'enfant doit attendre que la diarrhée et les vomissements aient cessé depuis 48 heures avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants ou suivre les consignes d'un fournisseur de soins de santé.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Rougeole <i>Virus</i>	Généralement observés de 7 à 21 jours après l'exposition : • Fièvre • Toux, écoulement nasal • Yeux rouges qui coulent • Petites taches blanches dans la bouche et la gorge (parfois) • Éruption cutanée sous forme de taches rouges sur le visage se propageant par la suite au reste du corps	Une personne est habituellement contagieuse 4 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée et 4 jours après.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Rubéole <i>Virus</i>	Généralement observés de 14 à 21 jours après l'exposition : • Éruption cutanée généralisée (rouge ou rose) qui apparaît habituellement d'abord sur le visage • Enflure des ganglions derrière les oreilles • Fièvre légère • Maux de tête • Malaise • Toux légère, éternuements et yeux rouges	Une personne peut être contagieuse 1 semaine avant l'apparition de l'éruption cutanée et jusqu'à au moins 4 jours après.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.
Salmonellose <i>Bactérie</i>	Généralement observés de 12 à 36 heures après l'exposition, mais peuvent également être observés de 6 heures à 7 jours après; il peut y avoir une apparition soudaine des symptômes suivants : • Nausées et vomissements • Maux de tête • Fièvre • Diarrhée • Douleurs et crampes abdominales • Présence possible de mucus et de sang dans les selles	Une personne est contagieuse tant que le microbe est présent dans les selles, généralement plusieurs semaines.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés. • Contact avec des animaux infectés.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Scarlatine/angine streptococcique <i>Bactérie</i>	Généralement observés de 2 à 5 jours après l'exposition : • Fièvre • Mal de gorge et parfois une langue rouge (framboisée) • Ganglions enflés • Éruption cutanée rouge et rugueuse, le plus souvent au cou, à la poitrine, aux aisselles, à la face interne des cuisses et aux plis du coude et de l'aîne	Les personnes non traitées sont très contagieuses pendant 2 à 3 semaines après le début de l'infection.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Contact direct avec la salive, les sécrétions nasales ou les sécrétions provenant d'une lésion.	L'enfant doit voir un fournisseur de soins de santé et avoir commencé le traitement antibiotique depuis 24 heures avant de reprendre ses activités habituelles et de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .
Shigellose <i>Bactérie</i>	Généralement observés de 1 à 3 jours après l'exposition, mais peuvent également être observés de 12 heures à 4 jours après : • Diarrhée • Sang et mucus dans les selles • Nausées • Fièvre • Crampes abdominales • Vomissements	Une personne est contagieuse tant qu'elle présente des symptômes et jusqu'à ce que le microbe ne soit plus présent dans les selles, habituellement jusqu'à 4 semaines après la maladie.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés. • Une mauvaise hygiène personnelle augmente le risque de propagation.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Varicelle (picote) <i>Virus</i>	Généralement observés de 14 à 16 jours après l'exposition, mais peuvent également être observés de 10 à 21 jours après l'exposition : • Petits boutons rouges sur tout le corps, pouvant se transformer en cloques remplies de liquide qui démangent, puis qui forment une croûte • Fièvre légère • Malaise	Une personne est contagieuse jusqu'à 5 jours, mais habituellement 1 ou 2 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée et jusqu'à ce que toutes les cloques aient formé une croûte (habituellement 5 jours après l'apparition de l'éruption cutanée).	Contact direct et indirect • Contact direct avec une personne infectée chez qui le microbe est présent dans le nez, la bouche, les yeux, les selles ou sur la peau. • Contact direct lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue ou tousse et qui se trouve à proximité. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Peut se contracter par contact avec une personne atteinte du zona.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants. Dans la mesure du possible, recouvrir les cloques qui n'ont pas encore formé une croûte.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.
Virus respiratoire syncytial (VRS) <i>Virus</i>	Généralement observés de 2 à 8 jours après l'exposition : • Écoulement nasal • Toux pouvant provoquer une respiration sifflante • Perte d'appétit et manque d'énergie • Irritabilité • Apnée (pauses respiratoires)	Une personne est habituellement contagieuse de 3 à 8 jours après l'apparition des symptômes. Les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées peuvent être contagieux jusqu'à 4 semaines.	Contact direct et indirect • Lorsqu'une personne respire l'air contaminé par des gouttelettes propagées par une personne infectée qui éternue, tousse ou parle. • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles, que la fièvre ait disparu depuis 24 heures et que les médicaments contre la fièvre ne soient plus nécessaires avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Non Signaler les taux élevés d'absentéisme pour cause de maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en remplissant le formulaire de signalement de l'absentéisme .

MALADIE	SYMPTÔMES	PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	MODE DE TRANSMISSION	RECOMMANDATIONS*	MISP À SIGNALER AU BUREAU DE SANTÉ
Yersiniose <i>Bactérie</i>	Généralement observés de 3 à 7 jours après l'exposition : • Diarrhée (il peut parfois y avoir présence de sang ou de mucus) • Douleurs et crampes abdominales • Fièvre	Une personne est contagieuse tant que le microbe est présent dans les selles et tant qu'elle présente des symptômes, généralement de 2 à 3 semaines. En l'absence de traitement, une personne peut transmettre le microbe pendant 2 à 3 mois.	Contact indirect • Lorsqu'une personne touche des surfaces contaminées par le microbe, comme les poignées de porte et les jouets, puis se touche le nez, la bouche ou les yeux. • Lorsqu'une personne consomme des aliments ou de l'eau contaminés. • Contact avec des animaux infectés.	L'enfant doit attendre que le Bureau de santé ait donné d'autres consignes avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants.	Oui Signaler la maladie au Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex en soumettant le formulaire de signalement d'une maladie infectieuse dans une école ou un centre de garde d'enfants.
Zona (herpès zoster) <i>Virus</i>	• Douleur • Fièvre • Maux de tête • Éruption cutanée provoquant douleur et sensation de brûlure qui apparaît habituellement sur un côté du corps ou du visage, caractérisée par des vésicules rouges remplies de liquide	Une personne est contagieuse dès l'apparition des vésicules et jusqu'à ce qu'elles soient recouvertes d'une croûte.	• Le zona ne se transmet pas d'une personne à une autre. Il s'agit d'une réactivation du virus de la varicelle chez une personne qui a déjà contracté la maladie. Contact direct • Une personne qui n'a jamais eu la varicelle peut la contracter en entrant en contact direct avec le liquide à l'intérieur des vésicules d'une personne atteinte de zona. Elle ne contractera pas le zona.	L'enfant doit attendre que son état lui permette de reprendre ses activités habituelles avant de retourner à l'école ou au centre de garde d'enfants. Les lésions doivent pouvoir être recouvertes.	Non

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

RÉFÉRENCES

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les ressources suivantes :

- BC Centre for Disease Control (2021). *Quick Guide to Common Childhood Diseases*. bccdc.ca
- Société canadienne de pédiatrie (2026). Soins de nos enfants. *Troubles de santé et traitements*. soinsdenosenfants.cps.ca
- Société canadienne de pédiatrie (2026). Soins de nos enfants. *Les infections courantes et votre enfant*. soinsdenosenfants.cps.ca
- Immunisation Canada (2026). immunize.ca/fr
- Agence de la santé publique du Canada (2026). *Maladies et affections*. canada.ca
- Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex (2025). IPAC and Outbreak Management in Child Care Centres. wechu.org
- Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex (2025). School and Childcare Centre Infection Control Resources. wechu.org