

Ministère de la Santé

Fiche d'information sur la vaccination : Programme de vaccination antipneumococcique pour les personnes âgées de 6 semaines et plus

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas destiné à donner un avis médical ou avis juridique.

Importance de la vaccination antipneumococcique

Les vaccins antipneumococciques peuvent prévenir la maladie causée par de nombreux types de pneumocoques. La plupart des infections à pneumocoques sont de nature bénignes. Les principales infections à pneumocoques incluent :

- l'otite moyenne (infections des oreilles)
- la sinusite (infections des sinus)

Cependant, certaines infections pneumococciques peuvent être graves et menacer le pronostic vital, notamment :

- la méningite (infection de l'enveloppe du cerveau)
- la septicémie (infection du sang)
- la pneumonie (infection des poumons)

Une infection pneumococcique qui envahit des parties du corps habituellement exemptes de bactéries peut entraîner une maladie sévère appelée pneumococcie invasive (PI), laquelle peut causer de graves symptômes, une incapacité permanente et même la mort.

Indications des vaccins antipneumococciques conjugués

Les vaccins antipneumococciques conjugués (Pneu-C) dont l'utilisation est autorisée au Canada sont sûrs et efficaces. Ils offrent une protection contre plusieurs différents types de bactéries responsables de l'infection pneumococcique. Les vaccins vous protègent en produisant des anticorps contre les agents pathogènes qui causent l'infection. Les vaccins sont offerts gratuitement aux personnes admissibles dans le cadre du programme de vaccination de l'Ontario financé par le secteur public.

Transmission des infections pneumococciques

Les pneumocoques sont très courants. Ces bactéries vivent dans le nez et la gorge de nombreuses personnes sans causer de maladie, mais elles peuvent tout de même se propager par du mucus ou de la salive infectés. Vous pouvez entrer en contact avec du mucus ou de la salive infectés de différentes façons, notamment :

- en étant près d'une personne infectée qui tousse ou éternue;
- en ayant des contacts étroits avec une personne infectée (par exemple en l'embrassant ou en la serrant dans vos bras);
- en touchant des objets qui ont récemment été exposés au mucus ou à la salive d'une personne infectée (comme le partage d'ustensiles, de tasses, de mouchoirs ou de jouets) et en vous touchant par la suite les yeux, le nez ou la bouche.

Risque de contracter une infection pneumococcique

Tout le monde peut contracter une infection pneumococcique, mais les enfants de moins de 2 ans, les personnes présentant certains problèmes médicaux ou d'autres facteurs de risque ainsi que les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus vulnérables à la pneumococcie invasive.

Vaccins Pneu-C financés par le secteur public en Ontario

Type de vaccin	Nom du vaccin	Nbre de types de pneumocoques contre lesquels le vaccin est efficace	Abréviation
Pneu-C	Vaxneuvance	15	Pneu-C-15
	Prevnar 20	20	Pneu-C-20
	Capvaxive	21	Pneu-C-21

Critères d'admissibilité aux vaccins Pneu-C

Admissibilité	Vaccin	Nombre de doses
Enfants âgés de 6 semaines à 4 ans ne présentant pas un risque accru de pneumococcie invasive	Pneu-C-15	Jusqu'à 3 doses
Personnes âgées de 6 semaines à 64 ans présentant certaines affections médicales et non médicales qui augmentent leur risque de pneumococcie invasive	Pneu-C-20	Jusqu'à 4 doses
Personnes âgées de 65 ans et plus (à l'exception des receveurs de greffe de cellules souches hématopoïétiques [GCSH])	Pneu-C-21	1 dose
Personnes âgées de 65 ans et plus qui sont des receveuses de GCSH	Pneu-C-21	Jusqu'à 4 doses

Les vaccinations de rattrapage sont offertes aux personnes qui n'ont pas reçu toutes les doses prévues de leur calendrier vaccinal. Les enfants âgés de 6 semaines à 17 ans qui présentent un risque accru de PI et qui n'ont pas encore reçu le vaccin Pneu-C-20 peuvent recevoir au moins une dose de ce vaccin. Les adultes âgés de 18 ans et plus qui ont déjà reçu tous les antipneumococciques financés par le secteur public auxquels ils étaient admissibles en raison de leur âge et de leur risque de PI peuvent ne pas être admissibles aux doses supplémentaires de vaccins antipneumococciques. Consultez votre professionnel de la santé pour connaître votre admissibilité aux vaccins et votre calendrier vaccinal.

Innocuité du vaccin

Les vaccins Pneu-C homologués par Santé Canada sont sans danger. Ils ne sont pas utilisés au Canada seulement, mais dans le monde entier. Les vaccins Pneu-C sont utilisés dans le cadre des programmes de vaccination de l'Ontario financés par la province depuis plus de 20 ans.

L'innocuité et l'efficacité des vaccins doivent être démontrées avant que leur utilisation ne soit homologuée au Canada. Une fois les vaccins homologués, leur innocuité fait l'objet d'une surveillance continue.

Réactions possibles après l'administration du vaccin

De nombreuses personnes ne présentent pas d'effets indésirables après l'administration des vaccins Pneu-C. Dans le cas contraire, ces effets sont généralement légers et durent un ou deux jours. Les effets indésirables graves sont très rares.

Voici quelques réactions courantes possibles aux vaccins Pneu-C :

- sensibilité, rougeur et/ou enflure au point d'injection du vaccin;
- fièvre;
- somnolence;
- perte d'appétit;
- céphalée;
- douleurs articulaires ou musculaires;
- frissons;
- agitation (irritabilité), seulement chez les nourrissons.

Il arrive que certaines personnes s'évanouissent après une intervention médicale, y compris la vaccination. Si cela vous est déjà arrivé, ou si vous ressentez des étourdissements avant, pendant ou après la vaccination, informez-en votre professionnel de la santé, qui pourra prendre des précautions supplémentaires pour assurer votre sécurité.

Comme avec n'importe quel médicament, il est possible, mais extrêmement rare (moins d'un cas sur un million de personnes) d'avoir une réaction potentiellement mortelle appelée anaphylaxie. Les signes de l'anaphylaxie peuvent comprendre l'urticaire, une enflure du visage et de la gorge, des difficultés respiratoires, une accélération de la fréquence cardiaque, des étourdissements ou de la faiblesse. C'est pourquoi il est important que vous restiez au cabinet de votre professionnel de la santé pendant au moins 15 minutes après avoir reçu le vaccin Pneu-C. En cas d'anaphylaxie, vous recevrez un médicament pour traiter les symptômes.

Toute réaction inattendue ou grave à un vaccin doit être signalée à votre professionnel de la santé ou au [bureau de santé publique local](#).

Prise en charge des effets indésirables du vaccin

Pour soulager la sensibilité et l'enflure, appliquez un linge frais et humide sur la zone d'administration du vaccin.

Il existe des médicaments pour soulager la fièvre ou la douleur. Consultez un professionnel de la santé si vous n'êtes pas certain du médicament ou de la dose à prendre et suivez les instructions figurant sur l'emballage.

Certaines personnes ayant des problèmes de santé, par exemple un système immunitaire affaibli, doivent communiquer avec leur professionnel de la santé si elles ont de la fièvre. Si vous avez reçu cette directive, communiquez avec votre professionnel de la santé même si vous pensez que la fièvre est causée par le vaccin.

Mesures à prendre en cas de problèmes graves

Une réaction allergique peut survenir une fois que vous avez quitté le centre de vaccination. Si vous observez les signes d'une réaction allergique grave (urticaire, enflure du visage et de la gorge, difficultés à respirer, accélération de la fréquence

cardiaque, étourdissements ou faiblesse), appelez le **9-1-1** et rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche.

Si d'autres signes et symptômes vous inquiètent, communiquez avec un professionnel de la santé.

Toute réaction inattendue ou grave à un vaccin doit être signalée à votre professionnel de la santé ou au [bureau de santé publique local](#).

Circonstances où il ne faut pas recevoir de vaccins ou il faut en reporter l'administration

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez subi une réaction allergique grave à une dose précédente de vaccin antipneumococcique ou à l'une des composantes du vaccin, y compris l'anatoxine diphtérique.

Dans certains cas, votre professionnel de la santé peut décider de reporter la vaccination antipneumococcique à une visite ultérieure. Les personnes présentant des affections bénignes comme un rhume peuvent habituellement être vaccinées. Les personnes présentant une affection modérée ou grave doivent généralement attendre d'être rétablies avant de recevoir un vaccin. Votre professionnel de la santé peut vous fournir de plus amples renseignements.

Carnet de vaccination

Votre professionnel de la santé doit consigner votre vaccination dans votre carnet de vaccination (carte jaune). Veuillez conserver votre carte jaune en lieu sûr et l'avoir sur vous chaque fois que vous recevez un vaccin chez votre professionnel de la santé.

Achat du vaccin pour les personnes qui ne sont pas admissibles au vaccin Pneu-C financé par le secteur public

Si vous ne répondez pas aux critères d'admissibilité au vaccin Pneu-C financé par le secteur public, vous pouvez demander à votre professionnel de la santé si le vaccin convient à votre situation. Dans ce cas, vous devrez déboursier les coûts du vaccin; toutefois, si vous bénéficiez d'un régime d'assurance privé, vous pouvez vous renseigner auprès de l'assureur pour savoir si le vaccin est couvert par ce régime.

Comment recevoir les vaccins antipneumococciques financés par le secteur public

Les vaccins Pneu-C sont offerts par les fournisseurs suivants :

Pneu-C-15

- Fournisseurs de soins de santé de première ligne (p. ex., médecins de famille, pédiatres, infirmières praticiennes)
- Bureaux de santé publique
- Centres de santé communautaire
- Hôpitaux

Pneu-C-20

Ce vaccin est offert par tous les fournisseurs de soins mentionnés pour le vaccin Pneu-15 ci-dessus, ainsi que dans les endroits suivants :

- Foyers de soins de longue durée
- Lieux d'habitation collective (p. ex., maisons de retraite)

Pneu-C-21

Ce vaccin est offert par tous les fournisseurs de soins et les endroits énumérés pour les vaccins Pneu-15 et Pneu-20 ci-dessus, ainsi que dans les endroits suivants :

- Pharmacies