



# 新冠肺炎（COVID-19）疫苗接种后 护理信息单

## 预期接种疫苗后几天的情况：

- 与药物和其他疫苗类似，新冠肺炎疫苗可能会引起副作用，尽管不是每个人都会出现这些副作用。大多数副作用是轻微的，并且不会持续很长时间。
- 接种疫苗后出现严重副作用的情况很少。但是，如果您在接种疫苗后三天内出现以下不良反应，请立即就医，如果身体严重不适，请拨打 911：
  - 荨麻疹
  - 脸部或口腔肿胀
  - 呼吸困难
  - 脸色非常苍白，严重嗜睡
  - 高烧（超过 40°C）
  - 惊觉或抽搐
  - 其他严重症状（如“针刺感”或麻木）。

接诊后，您的医疗服务提供者将告知 Windsor-Essex County Health Unit（温莎-埃塞克斯县卫生单位）接种疫苗后的任何严重副作用。

- 如果您担心接种疫苗后出现任何反应，请联系您的医疗服务提供者。向医疗服务提供者报告不良反应时，会向您问到一些关于您的健康和您所经历的反应的问题。接种疫苗后的不良反应报告会被送到 Public Health Ontario（安大略省公共卫生局）和 Public Health Agency of Canada（加拿大公共卫生署）。
- 如果您仍然需要接受第二剂，请告诉提供第二剂的人您所经历的任何副作用。

## 接种疫苗后的注意事项：

- 继续遵循公共卫生建议，预防新冠肺炎的传播，包括戴上口罩，与他人保持至少 2 米的距离，限制/避免与家庭以外的人接触。
- （除非您的医疗服务提供者认为有必要，）在您接种了两剂新冠肺炎疫苗且在接种第二剂疫苗后至少 28 天之前，请勿接种任何其他疫苗（第二剂新冠肺炎疫苗除外）。
- 如果您计划怀孕，应该向您的主要医疗人员咨询。
- 确保参加第二针接种的预约。第二次接种时，必须接种相同的疫苗。



为了获得预防新冠肺炎的最佳保护，即使在第一次用药后出现轻微的副作用，也要接受第二次接种，这一点非常重要。

- **请妥善保管此信息单和您今天接种疫苗时打印的新冠肺炎疫苗接种证明。**请携带新冠肺炎免疫接种证明（如果您愿意，还可携带其他疫苗接种记录）进行第二次接种。