



INFORMATIVA POST-VACCINO PER IL COVID-19

Cosa aspettarsi nei giorni successivi alla vaccinazione:

- Analogamente ai medicinali e agli altri vaccini, il vaccino per il COVID-19 potrebbe causare effetti collaterali, sebbene non tutte le persone potrebbero manifestarli. La maggior parte degli effetti collaterali sono di entità minore e di breve durata.
- Effetti collaterali gravi a seguito del vaccino sono rari. Tuttavia, qualora dovesse manifestare una o più delle seguenti reazioni avverse nei tre giorni successivi alla somministrazione del vaccino, contatti immediatamente un medico o chiami il 911 in caso di forte malessere:
 - Orticaria
 - Gonfiore del volto o della bocca
 - Difficoltà a respirare
 - Pallore estremo e forte sonnolenza
 - Febbre alta (oltre i 40 °C) o convulsioni o crisi epilettiche
 - Altri sintomi gravi (ad es. formicolio o intorpidimento)

Dopo avere ricevuto le cure mediche, il professionista sanitario provvederà a informare la Windsor-Essex County Health Unit (Azienda sanitaria della contea di Windsor-Essex) degli effetti collaterali della vaccinazione.

- Se le reazioni manifestate dopo la somministrazione del vaccino La preoccupano, contatti il medico. Quando segnala una reazione avversa a un professionista sanitario Le verrà chiesto di rispondere ad alcune domande relative alla Sua salute e alla reazione manifestata. Le segnalazioni di reazioni avverse a seguito dell'immunizzazione sono inviate alla Public Health Ontario (Agenzia di salute pubblica dell'Ontario) e alla Public Health Agency of Canada (Agenzia di salute pubblica del Canada).
- Se deve ancora ricevere la seconda dose, informi la persona che gliela somministrerà degli effetti collaterali da lei avuti.

Dopo avere ricevuto il vaccino, tenga presente quanto segue:

- Continui a osservare le raccomandazioni in materia di salute pubblica per la prevenzione della diffusione del COVID-19, incluso indossare la mascherina, mantenere una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone e limitare/evitare il contatto con persone estranee al proprio nucleo familiare.
- Non si sottoponga ad altre vaccinazioni (eccetto al secondo vaccino per il COVID-19) fino ad avere ricevuto entrambe le dosi di vaccino per il COVID-19 e che siano trascorsi almeno 28 giorni dopo la seconda dose (a meno che il suo medico non le consideri necessarie).
- Se sta pianificando una gravidanza, ne parli con il Suo medico.
- Si assicuri di presentarsi all'appuntamento per la seconda dose. La seconda dose deve essere dello stesso vaccino.



Al fine di ottenere la migliore protezione contro il COVID-19, è molto importante ricevere la seconda dose, anche se ha manifestato effetti collaterali lievi dopo la prima dose.

- **Conservi in un luogo sicuro la presente informativa e il certificato cartaceo della vaccinazione odierna per il COVID-19.** Porti il certificato di avvenuta vaccinazione per il COVID-19 (ed eventualmente altri documenti relativi alle immunizzazioni) all'appuntamento per la seconda dose del vaccino.