

# TRAITEMENT D'UNE INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE

## VOUS AVEZ UNE INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE

Cela signifie qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez été en contact avec le germe (la bactérie) qui cause la tuberculose. Votre corps a érigé un « mur » autour de ce germe et celui-ci « dort » (est dormant) pour le moment. Le germe ne rend pas le corps malade et vous ne pouvez pas le transmettre aux autres.

Votre fournisseur de soins de santé vous a prescrit un médicament qui tuera le germe de la tuberculose pendant qu'il dort. Vous prenez ce médicament pour éviter que le germe se réveille plus tard et vous rende malade. Le Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex vous fournira le médicament gratuitement.



## ISONIAZIDE (INH)

Il faut prendre ce médicament tous les jours pendant au moins 6 mois, habituellement 9 mois.



## RIFAMPICINE

Il faut prendre ce médicament tous les jours pendant 4 mois.


## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Vous pourriez devoir subir une prise de sang avant de commencer à prendre le médicament et durant le traitement.
- Vous devez prendre le médicament tous les jours. Utilisez une dosette (un pilulier) pour ne pas rater de doses.
- Prenez le médicament l'estomac vide (une heure avant de manger, ou deux ou trois heures après).
- Pour éviter les dommages au foie, ne consommez pas l'alcool pendant que vous prenez ce médicament.
- Vous devez prendre toutes les doses. Si vous ratez des doses ou cessez de prendre le médicament avant la fin du traitement, votre corps pourrait y bâtir une résistance.

### *Qu'arrive-t-il si j'oublie de prendre mon médicament?*

- Si vous ratez une dose, prenez-la dès que possible. Si c'est presque l'heure de la prochaine dose, attendez.

**Ne prenez pas deux doses à la fois.**



## Effets secondaires possibles

L'isoniazide et la rifampicine sont sécuritaires. La plupart des gens peuvent prendre l'un ou l'autre sans problème. Les effets secondaires le plus grave de ces médicaments sont les problèmes de foie. Dites-le à votre médecin si vous avez une maladie du foie, si vous prenez d'autres médicaments ou si vous consommez de l'alcool. Les personnes âgées pourraient être plus sensibles à ces médicaments.

Appelez votre fournisseur de soins de santé si vous avez n'importe lequel des symptômes suivants :

- perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue ou faiblesse pendant plus de trois jours;
- urine brune ou très foncée;
- jaunissement de la peau ou du blanc des yeux;
- fièvre qui dure plus de trois jours;
- sensibilité abdominale, surtout dans le haut de l'abdomen, du côté droit;
- éruption cutanée (rash) ou démangeaisons.

### Autres effets secondaires possibles de l'isoniazide

- changements de la vision – consultez un spécialiste de la vue;
- maux de tête;
- engourdissement ou picotements dans les mains et les pieds (c'est rare). Votre fournisseur de soins de santé pourrait vous prescrire de la pyridoxine (vitamine B6) pour prévenir cet effet.

### Autres effets secondaires possibles de la rifampicine

- Les larmes, l'urine, la salive et les selles pourraient avoir une teinte rouge orange. C'est courant et ça ne dure que le temps que vous prenez le médicament. Il se peut que vous ne puissiez pas porter de verres de contact, car ceux-ci risquent de devenir tachés en permanence.
- La rifampicine peut réduire l'efficacité des médicaments contraceptifs. Si vous utilisez une telle méthode de contraception, vous devriez utiliser une deuxième méthode, comme un condom.

**Si vous avez des symptômes qui pourraient être causés par le médicament et que vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de soins de santé immédiatement, arrêtez de prendre le médicament jusqu'à ce que vous obteniez une consultation médicale.**

Références fournies sur demande.



## JE DOIS ME RAPPELER...

- de prendre mon médicament l'estomac vide;
- de prendre mon médicament à la même heure tous les jours;
- d'utiliser ma dosette et de la garder en lieu sûr;
- de ne pas consommer d'alcool;
- de consulter mon fournisseur de soins de santé si j'ai des problèmes;
- de ne pas prendre d'acétaminophène (Tylenol ou autres médicaments qui contiennent de l'acétaminophène) pour soulager la douleur;
- d'aller chercher d'autres médicaments avant d'en manquer;
- de consulter mon fournisseur de soins de santé ou le pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

## Votre infirmière ou infirmier de la santé publique est :

Son numéro de téléphone est :

519 258-2146, poste \_\_\_\_\_

Vous pouvez passer prendre vos médicaments sur rendez-vous du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 15.

### BUREAU DE SANTÉ

#### DE WINDSOR-COMTÉ D'ESSEX

519 258-2146, POSTE 1420 | Sans frais : 1 800 265-5822  
1005, avenue Ouellette, Windsor (Ontario) N9A 4J8



wechu.org